

Sifilis

La Sifilis es una STD causada por la espiroqueta *Treponema Pallidum*

Evolución

Primaria: lesión característica de CHANCRE, no dolorosa, Bordes redondeados y elevados y una base no infectada. (Pueden ser infecciosas secundarias y dolor)
Aparecen en el Cuello uterino, la vagina, vulva (boca -cerca del ano)

→ Sifilis latente temprana Primer año después de la sifilis no tratada

→ Sifilis latente tardía un año después de la infección inicial.

Secundaria: la bacteremia aparece en término de 6 semanas a 6 meses después de que surge el chancre

Signo erupción maculosa, (todo el cuerpo)

Terciaria: No tratada, puede surgir incluso 20 años después de latencia. — Afecciones Cardiovasculares
SNC
Músculo esquelético

Diagnóstico: Anticuerpos fluorescentes

Tratamiento

① Penicilina benzatínica 6 2.4 millones de unidades Vía intramuscular única dosis. Primaria, Secundaria y latente temprana <1 Año
Mujeres alérgicas a la Penicilina y NO embarazada: doxiciclina 100mg VO 2 veces al día durante 2 semanas

② Penicilina benzatínica 6 2.4 millones de unidades Vía intramuscular una dosis cada semana durante tres semanas. Terciaria, latente tardía y Cardiovascular.
Mujeres alérgicas a la Penicilina y NO embarazada: doxiciclina 100mg VO 2 veces al día durante 4 semanas